



JAMA: Nguy cơ mắc bệnh viêm da cơ địa khi sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi

Kết quả

- ✚ Bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên không có chẩn đoán mắc bệnh viêm da cơ địa ở thời điểm đưa vào nghiên cứu.
- ✚ Thời gian thực hiện: 01/01/1994 đến 01/01/2015.
 - * Dữ liệu được phân tích từ 06/01/2020 đến 06/02/2024.
- ✚ Tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại - Vương quốc Anh.

Nghiên cứu theo dõi dọc

- ✚ Tỷ lệ mắc viêm da cơ địa ở những bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp **cao hơn** so với những bệnh nhân không sử dụng, lần lượt là 12 so với 9 trong tổng số 1.000 người-năm.
- ✚ Bệnh nhân sử dụng **bất kỳ loại thuốc** điều trị tăng huyết áp nào đều có nguy cơ mắc bệnh viêm da cơ địa **tăng 29%**.

Sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp có liên quan đến **tăng nhẹ nguy cơ viêm da cơ địa**, trong đó nguy cơ **cao nhất với nhóm chẹn kênh canxi và nhóm lợi tiểu**, nguy cơ thấp nhất với nhóm ức chế enzyme chuyển angiotensin và nhóm chẹn beta.

Hiện nay, vẫn cần thêm các nghiên cứu khác để làm rõ các cơ chế tiềm ẩn của mối liên quan này

Khuyến cáo: Nhân viên y tế nên có phương pháp quản lý bệnh nhân tăng huyết áp cao tuổi mắc

Nguồn: <http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2583/JAMA-nguy-co-mac-benh-viem-da-co-dia-khi-su-dung-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-o-nguoi-cao-tuoi.htm>

Đơn vị thông tin thuốc xin gửi thông tin về ADR mới được cập nhật đến các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh.