



## Health Canada: Nguy cơ tiêu cơ vân khi sử dụng linezolid

Các trường hợp tiêu cơ vân có liên quan đến tăng creatine kinase (CK) đã được ghi nhận khi sử dụng linezolid.

Trong một số trường hợp, tiêu cơ vân có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính (AKI).

### Thông tin dành cho nhân viên y tế

Cần nhắc **giám sát thường xuyên** chỉ số creatinin kinase (CK) đối với các bệnh nhân:

- ✚ Có nguy cơ cao bị viêm cơ hoặc tiêu cơ vân.
- ✚ Đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng các thuốc có liên quan đến tình trạng viêm cơ hoặc tiêu cơ vân.
- ✚ Có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của tiêu cơ vân, bao gồm đau cơ, yếu cơ, nước tiểu sậm màu.

**Nếu có triệu chứng của tiêu cơ vân, nên ngừng sử dụng linezolid và bắt đầu các biện pháp can thiệp phù hợp.**

**Nguồn:** <http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2570/Health-canada-nguy-co-tieu-co-van-khi-su-dung-linezolid.htm>

Đơn vị thông tin thuốc xin gửi thông tin về ADR mới được cập nhật đến các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh.