



Health Canada: Nguy cơ viêm ống thận kẽ thận cấp khi sử dụng omeprazol

Health Canada đã cập nhật bổ sung nguy cơ viêm ống thận kẽ cấp (tubulointerstitial nephritis -TIN) đối với 2 chế phẩm thuốc chứa omeprazol và omeprazol magnesi vào các mục Thận trọng, Phản ứng có hại và Thông tin dành cho bệnh nhân trong tờ thông tin sản phẩm lưu hành tại Canada.

Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế

Viêm ống thận kẽ cấp (TIN) đã được ghi nhận ở bệnh nhân sử dụng **omeprazol** và có thể xuất hiện vào **bất cứ thời điểm nào trong quá trình điều trị.**

Viêm ống thận kẽ cấp có thể tiến triển thành suy thận.

Ngừng sử dụng omeprazol ngay khi nghi ngờ mắc viêm ống thận kẽ cấp và có biện pháp xử trí kịp thời cho người bệnh.

Bệnh nhân được khuyến cáo tham khảo ý kiến của nhân viên y tế ngay khi **xuất hiện các triệu chứng của viêm ống thận, bao gồm giảm lượng nước tiểu, tiểu ra máu, sốt, phát ban, cứng khớp.**

Đơn vị thông tin thuốc xin gửi thông tin về ADR mới được cập nhật đến các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh.